

香川県の淡水産カイミジンコ 1.

久 米 修

〒761-8074 高松市太田上町78-11

Freshwater Podocopida in Kagawa Prefecture 1.

Osamu Kume, 78-11, Ootakamimachi, Takamatu 761-8074, Japan

はじめに

カイミジンコ類は、甲殻類の仲間、カイムシ綱カイミジンコ目に属し、海産と淡水産がある。シセレ上科とムカシカイミジンコ上科、キプリス上科に分かれており、キプリス上科はほとんど淡水産と言われている (大久保, 2004)。

筆者は、香川県産淡水苔虫と淡水海綿の調査を実施してきたが、その際得られた試料の中にカイミジンコ類が含まれている事に気づき、大久保一郎博士の指導を仰ぎ調査を実施してきた。ただその途中で、大久保博士が病気で倒れられ、やむを得ず調査を中断していた。しかし香川県におけるカイミジンコ類の系統的な調査は、これまで殆ど行われておらず、記録を残す事が必要であると考えて、途中経過であるがここに報告する。

本稿のとりまとめに当たり、カイミジンコ類の分類のご指導を賜った大久保一郎博士に、改めて厚く御礼申し上げます。

調査方法

当初、カイミジンコ類の標本は、香川県内の溜め池を中心に調査を実施していた淡水苔虫と淡水海綿用に採取した浮遊物の中から、実体顕微鏡下でカイミジンコの虫体を選別し

て採集した。その後、溜め池だけでなく、水田や水槽等の淡水域にも生息している事がわかり、金魚掬い用布網で水中から直接虫体を掬い取り採集した。

得られた虫体は、そのまま乾燥標本とし、一部は生体をアルコール溶液に入れ、殻が開いた後、殻を開けて解剖標本を作製した。標本は、トラガカントゴムを塗布したペーパーライドに貼付後、大久保博士に送付して同定を依頼した。また筆者は、大久保博士に同定していただいた標本を基準にして、大久保 (2004) を参考にしながら、実体顕微鏡下で同定を行った。

この同定結果に基づき、標本産地目録を作成した。とりあげた種の学名と和名、順番は大久保 (2004) に従って配列した。種の同定に疑問が残る標本については、その種の後に?を付けて一覧に加えた。標本産地目録は、市町単位ごとに東から西に並べ、採集地名、標本番号および採集年月日の順に記載した。採集地名は、市町ごとに(:)で区切り、同一の市町名あるいは大字、字名が続く場合はその後は省略した。標本産地名は、標本を採集した地点の属する市町の地名を記載した。また市町合併により、呼び名の変更があるものについては、採集時の市町名を表示した。標本番号の頭に付く記号のKは筆者が同

定したもので、それ以外は大久保博士の同定を示す。

使用した標本は、一部を大久保博士が、残りの大部分を筆者が保管している。

各 論

今回香川県内206箇所淡水域でカイミジンコ類の標本が得られた。この内、庭園の池が1箇所、貯水用ダム湖が3箇所、残りは全て溜め池であった。カイミジンコ類が確認された溜め池の立地は、平野部から丘陵部、山際と幅広いが、種によっては特定の立地に生息していると推察出来るものがあつた。溜め池の大きさについては、小規模から中規模のものが多かった。

確認されたカイミジンコは、キプリス上科に属する14種で、他に同定出来なかつたものが種レベルで3種、属レベルで3種あり、少なくとも20分類群のカイミジンコが香川県に生息していた。

1 箇所の溜め池で確認されたカイミジンコの種数は、1～2種が多いが、最大では4種が同時に採集された。

種類ごとの産地の詳細は以下の通りである。

1. マルカイミジンコ *Notodromas monacha* (O. F. Muller, 1776)

香川県では稀で、山際の小規模な溜め池2箇所で見つかり確認した。

<標本産地>綾上町粉所東仲和田「溜池15」(HB1432-2001.10.4); 仲南町七箇小池「下池」(HB1225-2000.9.27)

2. シカクカイミジンコ属一種 *Ilyocypris* sp.

大久保 (2004) によれば、シカクカイミジンコ属は、日本でナミシカクカイミジンコ *I. dentifera* とニホンシカクカイミジンコ *I. nipponica*、シカクカイミジンコ *I. japonica* の3種が確認されている。同定は、殻の外形で

はなく、生殖器官や付属肢などで分類される事から虫体を解剖する必要がある、ここでは区別できなかった。

香川県の溜め池では極稀である。

<標本産地>高瀬町下麻河中「九頭神池」(HB639-1996.3.4)

3. ヤマトカンドナ *Fabaeformiscandona japonica* (Okubo, 1990)

平野部から丘陵部にかけての溜め池で見つかった。

<標本産地>大内町土居土居「王子池」(HB1204-2000.4.9); 国分寺町福家川原「溜池5」(HB1592-2002.12.28); 綾歌町岡田東椎尾「溜池3」(HB940-1998.4.4); 高瀬町上高瀬末「末池」(HB1094-1999.9.18); 三野町吉津宗吉「新池」(HB884-1998.2.21); 豊中町笠田笠岡稗田「鷹ノ子池」(HB718-1997.2.16)

4. シリアゲカンドナ *Fabaeformiscandona* cf. *subvomerina* Liu & Lu, 1999

平野部から丘陵部にかけての溜め池で稀に見られ、ヤマトカンドナ *F. japonica* と混生している所があつた。

<標本産地>綾南町陶中尾「陶濁池」(HB1053-1999.2.13); 丸亀市郡家町大林上「小林池」(HB372-1994.2.5); 多度津町葛原永井「新池」(HB352-1994.1.23); 三野町吉津宗吉「新池」(HB884-1998.2.21)

シリアゲカンドナ?

<標本産地>綾歌町岡田西畑田下「成願寺池」(HB437-1994.2.20)

5. サンカクカンドナ *Fabaeformiscandona* cf. *lapnevae* (Sars, 1898)

丘陵部の溜め池2箇所で見つかった。

<標本産地>大川町田面大東「溜池25」(HB1567-2002.12.3); 牟礼町原王子「王子中池」(HB424-1994.2.19)

・カンドナ属一種 *Fabaeformiscandona* sp.

平野部から丘陵部にかけての溜め池で採れたが、種の同定に至らなかったもの他、幼生或いは破損標本のため同定出来なかったものを含む。カンドナ属全体について、香川県の溜め池産カイミジンコ類では比較的少ない。

<標本産地>大内町馬篠馬篠「坂下上池」(HB1172-2000.3.5), 大谷大谷「蓮池」(HB1198-2000.4.9), 町田喜定「新池」(KHB1203-2000.4.9); 大川町田面砕石「溜池8」(HB795-1997.12.23), 富田東火山「溜池19」(KHB1209-2000.4.16); 寒川町神前石井「下池」(HB1027-1999.1.16); 三木町井上中谷「岩川下池」(HB419-1994.2.19); 牟礼町原西村「西浦池」(HB422-1994.2.19); 高松市高松町「上池」(HB479-1994.3.20); 国分寺町福家川西「溜池16」(HB1605-2002.12.30), 下福家「蛇池」(HB1634-2003.1.18); 綾上町西分境場「前池」(KHB1557-2002.11.3); 綾南町畑下井「甲骨池」(HB640-1996.3.9), 陶北内「溜池25」(HB1583-2002.12.23); 綾歌町富熊次見「山ノ神池」(HB929-1998.3.28); 丸亀市川西町北宮西「原池」(HB371-1994.2.5); 満濃町岸ノ上堀切「溜池16」(HB1573-2002.12.15); 詫間町詫間本村上「篠谷池」(HB1336-2001.1.8)

6. カンドナモドキ *Candonopsis kingsleii* (Brady & Robertson, 1870)

丘陵部にある中規模の溜め池1箇所で見つかった。

<標本産地>山本町河内長野「逆瀬池」(HB1213-2000.4.30)

7. イボオヨギカイミジンコ *Physocypria nipponica* Okubo, 1990

平野部から山際の溜め池まで生息しており、栗林公園の池でも見つかった。香川県の溜め池産カイミジンコ類では普通に見られる。

<標本産地>引田町黒羽庄原東「下内池」(HB1049-1999.1.31); 大内町中山久保田「大池」(HB193-1993.2.14), 三殿三殿「遠田池」(KHB805-1998.1.3), 馬篠馬篠「坂下池」(HB1171-2000.3.5), 「坂下上池」(KHB1172-2000.3.5), 土居土居「天神池」(HB1207-2000.4.9); 大川町富田西田辺町「田辺池」(HB738-1997.3.8), 田面大東「田面新池」(HB1566-2002.12.3); 長尾町名池の内「荒池」(HB615-1996.1.21); 三木町永上長楽寺「藤池」(HB339-1994.1.21), 田中南石塚「ニツ池」(HB344-1994.1.21), 池戸深谷「調池」(HB360-1994.1.29), 井上馬場「砂入池」(HB415-1994.2.19), 「上所池」(HB416-1994.2.19), 中谷「岩川下池」(HB419-1994.2.19), 鹿庭西鹿庭「緑谷池」(HB616-1996.1.21), 上高岡池下「平野池」(HB1083-1999.4.25); 高松市太田下町「三条池」(HB221-1993.2.20), 高松町「上池」(HB479-1994.3.20), 川島東町「新池」(KHB487-1994.4.13), 鬼無町是竹「清水上池」(HB598-1996.1.4), 栗林町栗林公園「西湖」(HB784-1997.9.3), 前田西町東谷「下池」(HB978-1998.11.7); 香南町池ノ内出宮原「中池」(HB967-1998.10.18); 塩江町安原下骨川「引上池」(HB1504-2002.1.12); 国分寺町福家日名代「皿池」(HB442-1994.2.25), 川原「溜池3」(HB1590-2002.12.28), 「溜池5」(HB1592-2002.12.28), 川西西「西大谷池」(HB1600-2002.12.28), 本村北「東大谷池」(HB1612-2002.12.31), 「小池」(HB1614-2002.12.31), 「富池」(HB1615-2002.12.31), 「黒エ門池」(HB1616-2002.12.31), 「赤池」(HB1617-2002.12.31), 北谷上「奥池」(HB1619-2002.12.31), 「溜池22」(HB1620-2002.12.31), お前泉「楠井中池」(HB1628-2003.1.11), 新名橋「嵐谷池」(KHB1610-2002.12.30); 坂出市王越町木沢「北池」(HB212-1993.2.20), 府中町北前谷「上所池」(KHB449-1994.2.26); 綾上町山田上東寺内「徳利池」(HB1300-2000.

12.23), 山田下平見「久保池」(HB1303-2000.12.23), 吉田「溜池9」(HB1305-2000.12.23); 綾南町畑田万屋「打田池」(HB596-1996.1.3), 茶円原「鷓生池」(HB963-1998.10.17), 陶北山田「庄屋上池」(HB1050-1999.2.13), 「庄屋池」(HB1051-1999.2.13), 中尾「陶濁池」(HB1053-1999.2.13), 北内「蓮池」(HB1581-2002.12.23), 「僧池」(HB1582-2002.12.23), 「溜池26」(HB1584-2002.12.23), 猿王北「中池」(HB1056-1999.2.13), 日原「溜池14」(HB1551-2002.10.24), 「溜池15」(HB1552-2002.10.24), 「溜池23」(HB1578-2002.12.23); 綾歌町岡田西畑田下「成願寺池」(HB437-1994.2.20), 北山「新池」(HB438-1994.2.20); 丸亀市川西町南剣木「八丈池」(HB357-1994.1.23); 善通寺市原田町四条「道池」(HB799-1997.12.28); 多度津町葛原永井「新池」(HB352-1994.1.23); 高瀬町比地長坂「権現池」(HB873-1998.2.21), 羽方瀬丸池「瀬丸池」(HB1218-2000.7.29); 観音寺市高屋町西上「大滝池」(KHB614-1996.1.20)

イボオヨギカイミジンコ?

<標本産地>大内町三殿三殿「飯山池」(HB804-1998.1.3); 大川町田面大東「田面新池」(HB1248-2000.11.4); 高松市高松町池部谷「唐戸下池」(HB1110-1999.11.6)

8. シマイボカイミジンコ? *Hemicypris ovata* Moniez, 1892?

殻の上半に褐色の模様がある事から本種と推定されるが、種の同定には到らなかった。山際にある小規模の溜め池1箇所で見つかった。

<標本産地>仲南町七箇小池「下池」(HB1225-2000.9.27)

9. ヒダライボカイミジンコ属一種 *Hemicypris* sp.

ヒダライボカイミジンコ属は、日本で6種記録されているが(大久保, 2004), 比較的

類似しており、種の同定までには至らなかった。丘陵部の2箇所の溜め池で見つかった。<標本産地>牟礼町原王子「王子奥池」(HB901-1998.3.7); 国分寺町新居万福寺「万福寺池」(HB465-1994.3.5)

10. ユビヌキカイミジンコ *Cypris subglobosa* Sowerby, 1840

平野部の小規模な溜め池1箇所で見つかった。

<標本産地>三野町吉津汐木原「瀬入池」(HB1348-2001.1.13)

11. ホシクズカイミジンコ? *Herpetocypris chevreuxi* (Sars, 1896)?

平野部の小規模な溜め池1箇所で見つかったが、種の同定には至らなかった。

<標本産地>善通寺市原田町四条「道池」(HB799-1997.12.28)

12. ホソナガカイミジンコ *Stenocypris hislopi* Ferguson, 1969

平野部から山際の溜め池まで生息しており、香川県の溜め池産カイミジンコ類では比較的少ない。

<標本産地>引田町坂元小坂「池田池」(HB1456-2001.11.24); 白鳥町与田山行成「行成池」(HB1441-2001.11.4); 大内町三殿三殿「飯山池」(HB804-1998.1.3); 志度町小田浦小田「合蔵池」(HB1479-2001.12.27); 土庄町豊島唐櫃岡「千代田池」(HB791-1997.12.11); 牟礼町牟礼松井「松井池」(HB973-1998.11.4); 国分寺町福家川西西「西大谷池」(HB1600-2002.12.28); 綾南町畑田万屋「打田池」(HB596-1996.1.3), 陶日原「溜池23」(HB1578-2002.12.23); 仲南町七箇小池「下池」(HB1225-2000.9.27); 高瀬町下麻河中「九頭神池」(KHB639-1996.3.4), 比地中神ノ木「中池」(HB882-1998.2.21), 上麻耨「新池」(HB1098-1999.9.26); 山本町辻池の向「国吉池」

(HB798-1997.12.27);大野原町丸井西間谷「西間谷池」(HB1630-2003.1.13)

ホソナガカイミジンコ?

破損標本のため同定出来なかったものを含む。HB1248はミドリホソナガカイミジンコ *S. viridis* の可能性がある。

<標本産地>引田町黒羽庄原東「下内池」(HB1049-1999.1.31);大川町田面大東「田面新池」(HB1248-2000.11.4);寒川町神前石井「クロジ池」(HB1030-1999.1.16)

13. ハイナガカイミジンコ? *Candonocypris assimilis* Sars, 1894?

平野部から丘陵部の溜め池2箇所で見つかった。破損標本のため同定出来なかったものを含む。

<標本産地>志度町鴨部深宝「溜池2」(KHB 627-1996.2.12);香南町池ノ内置樋「大道池」(HB966-1998.10.18)

14. カワリハイナガカイミジンコ

Candonocypris caledonica (Méhes, 1939)

丘陵部の溜め池1箇所で見つかった。

<標本産地>高松市高松町「菱池」(HB 484-1994.3.20)

・ハイナガカイミジンコ属一種 *Candonocypris* sp.

ハイナガカイミジンコ属は、日本でハイナガカイミジンコとカワリハイナガカイミジンコの2種確認されているが(大久保, 2004), 種の同定には至らなかった。

<標本産地>三野町吉津汐木原「瀬入池」(HB1348-2001.1.13)

15. アオナガカイミジンコ属一種 *Dolerocypris* sp.

丘陵部の小規模な溜め池1箇所で見つかったが、幼生標本のため種を同定出来なかった。

<標本産地>詫間町詫間田井「平池」(HB 1327-2001.1.8)

16. ナガカイミジンコ *Tanycypris pellucida* (Klie, 1900)

丘陵部から山際の小規模な溜め池3箇所で見つかった。

<標本産地>白鳥町東山刈居川「内田池」(HB1126-2000.1.2);満濃町長尾北山「山神池」(HB1439-2001.10.27);高瀬町上勝間西脇「溜池25」(HB1237-2000.10.21)

ナガカイミジンコ?

ナガカイミジンコ属は日本で1種だけ知られているが(大久保, 2004), 幼生或いは破損標本のため同定出来なかった。

<標本産地>大内町三殿三殿「上池」(HB 1420-2001.9.23);高瀬町下麻五反地「寒池」(KHB1239-2000.10.21)

17. ヨシマカイミジンコ *Strandesia vittata* (Sars, 1903)

丘陵部から山際の溜め池に生息しており、香川県の溜め池産カイミジンコ類では比較的数量が少ない。

<標本産地>長尾町造田野間田野間田東「蓮池」(HB673-1997.1.4);牟礼町原西村「西浦池」(HB422-1994.2.19);国分寺町福家川西西「西大谷池」(HB1600-2002.12.28);綾南町陶中原「溜池16」(HB1553-2002.10.24), 日原「溜池20」(HB1575-2002.12.23), 「溜池24」(HB1579-2002.12.23);綾歌町栗熊東原「葉池」(HB950-1998.10.3);満濃町炭所西江畑「オハナ池」(HB1446-2001.11.7);仲南町十郷買田「奥ノ池」(HA380-2002.11.24);高瀬町上麻大麻山「多興地池」(HB1430-2001.10.2);豊中町笠田笠岡六ツ松「宮池」(HB748-1997.3.9);財田町財田上荒戸上「溜池6」(HB 1173-2000.3.10);大野原町五郷井関唐谷「有松池」(HB1560-2002.11.10)

ヨシマカイミジンコ?

<標本産地>高瀬町下麻大郷楼「溜池39」
(HB1429-2001.10.2)

18. マエスジカイミジンコ *Cyprretta seurati*
Gauthier, 1929

丘陵部の小規模な溜め池1箇所で見つかった。

<標本産地>綾南町陶日原「溜池20」(HB1575-2002.12.23)

マエスジカイミジンコ?

平野部から丘陵部の溜め池2箇所で見つかった。

<標本産地>長尾町東是行谷上「溜池8」
(HB991-1998.11.28); 香南町池ノ内置樋「大道池」
(HB966-1998.10.18)

19. アオシマカイミジンコ *Cypridopsis vidua*
(O. F. Muller, 1776)

丘陵部から山際の小規模な溜め池とダム湖で見つかった。香川県の溜め池産カイミジンコ類では比較的少ない。

本種とヨシマカイミジンコは亜科の段階で分けられているが(大久保, 2004), 一見混同しやすい。大久保(私信)によれば, アオシマカイミジンコは, クロシマカイミジンコとほぼ同じ大きさで, 殻の最高点がほぼ中央にある。これに対してヨシマカイミジンコは, 少し大形で, 殻の最高点が中央より前に位置している事で区別出来る。

<標本産地>長尾町西西塚原「谷池」(HB959-1998.10.16); 三木町井上山田「東山田下池」
(HB657-1996.12.21); 高松市西植田町中谷「溜池14」
(HB957-1998.10.10); 綾上町山田下吉田「溜池9」
(HB1305-2000.12.23); 綾歌町栗熊西長者原「プリ池」
(HB1220-2000.9.16); 仲南町七箇塩入「野口ダム」
(HB1086-1999.5.3); 高瀬町下麻大郷楼「溜池39」
(HB1429-2001.10.2)

アオシマカイミジンコ?

破損標本のため同定出来なかったものを含む。

<標本産地>寒川町石田西吉野「溜池12」
(KHB1005-1998.12.26); 綾上町粉所西西朽木「朽木池」
(HB1306-2000.12.23); 綾南町陶北内「切矢池」
(HB1580-2002.12.23); 高瀬町上高瀬末「末池」
(KHB1094-1999.9.18), 平見「長砂古池」
(HB1096-1999.9.18)

20. クロシマカイミジンコ *Cypridopsis nigrovittata* Okubo, 1990

平野部から山際の溜め池まで生息しており, 香川県の溜め池産カイミジンコ類では普通に見られる。

大久保博士は, 当初チャシマカイミジンコ *C. biwaensis* としていたが, 後にクロシマカイミジンコに訂正しており(大久保私信), ここでは大久保の見解に従った。

大久保(2004)によれば, 両種の違いは殻の模様による。クロシマカイミジンコの殻には, 4本の黒色の横縞があり, 最後の縞は目立たず, 4本とも前下に真直ぐすすむ。これに対して, チャシマカイミジンコの殻には, 褐色の4本の横縞があり, 最後の縞ははっきりしており, 2番目と3番目の縞の中央でH型につながった縦縞がある。香川県の溜め池産標本では, 縞の色は褐色から黒色と多様で, チャシマカイミジンコ型の縞模様の有るものが多い。

<標本産地>白鳥町東山東円坊「小池」(HB1127-2000.1.2); 大内町三殿三殿「飯山池」
(HB804-1998.1.3), 馬篠馬篠「坂下上池」
(HB1172-2000.3.5), 大谷姿谷「溜池7」
(HB1201-2000.4.9), 土居土居「天神池」
(KHB1207-2000.4.9); 寒川町石田西山田「溜池6」
(HB994-1998.11.28), 吉野「新池」
(HB1004-1998.12.26), 神前石井「クロジ池」
(HB1030-1999.1.16); 長尾町昭和白羽「観音池」
(HB892-1998.2.22), 西西塚原「谷池」
(HB959-1998.10.16); 三木町氷上長楽寺「藤池」
(KHB339-1994.1.21), 井上戸敷「菰子池」
(HB362-1994.1.29), 馬場「砂

入池」(HB415-1994.2.19),「上所池」(HB416-1994.2.19),上高岡池下「平野池」(HB1083-1999.4.25);牟礼町牟礼松井「松井池」(HB973-1998.11.4);高松市高松町池部谷「長尾池」(HB1108-1999.11.6),「唐戸池」(HB1109-1999.11.6);国分寺町福家川西「西大谷池」(HB1600-2002.12.28),「溜池18」(HB1607-2002.12.30),下福家「新池」(HB1633-2003.1.18);綾上町牛川泉谷「浦谷池」(HB1290-2000.12.14),山田上東寺内「德利池」(HB1300-2000.12.23);綾南町畑田万屋「打田池」(HB596-1996.1.3),陶馬酔木「王子池」(HB691-1997.1.18),日原「溜池14」(HB1551-2002.10.24),「溜池20」(HB1575-2002.12.23),「溜池22」(HB1577-2002.12.23),「溜池23」(HB1578-2002.12.23),「溜池24」(HB1579-2002.12.23),中原「溜池19」(HB1556-2002.11.2),千疋上の谷「常行池」(HB1307-2000.12.23);丸亀市土器町東一丁目「雁又池」(HB385-1994.2.11),中府町一丁目「蓮池」(HB386-1994.2.11);満濃町炭所東広袖「鳶の巣池」(HB1451-2001.11.7),真野真野「新池」(HB1574-2002.12.15);仲南町七箇春日「もっこく池」(HB645-1996.11.3);善通寺市原田町四条「道池」(HB799-1997.12.28);高瀬町比地中宮ノ谷「宮池」(HB880-1998.2.21),下勝間道音寺「鬼ヶ窪」(HB1091-1999.9.17),佐股坊ノ奥「溜池19」(HB1226-2000.9.30),上勝間首山「下池」(HB1265-2000.11.23),下麻九頭神「九頭神池」(HB1427-2001.10.2);豊中町笠田笠岡稗田「鷹ノ子池」(HB718-1997.2.16),六ツ松「宮池」(HB748-1997.3.9);詫間町詫間田井「平池」(HB1327-2001.1.8);仁尾町仁尾詫間越「新池」(HB1337-2001.1.8),仁尾の上「下梅花池」(HB1340-2001.1.8);財田町財田中村明「溜池4」(HB1066-1999.2.14);豊浜町箕浦川西「新池」(HB1461-2001.12.9),堀切「溜池1」(HB610-1996.1.20)
クロシマカイミジンコ?

殻の縞模様が薄くなったり消失したもので、同定に至らなかったものをここにまとめた。幼生或いは破損標本のため同定出来なかったものを含む。溜め池以外で、洪水調整池1箇所で見つかった。

<標本産地>大内町土居土居「王子池」(HB1204黒縞型-2000.4.9),「天神池」(HB1207-2000.4.9);長尾町造田是弘沢福「造田上池」(HB898-1998.2.22);牟礼町原西村「西浦池」(HB422-1994.2.19),大町羽間「羽間中池」(HB425-1994.2.19);高松市川島東町「新池」(KHB487-1994.4.13),高松町池部谷「唐戸下池」(HB1110-1999.11.6);国分寺町福家川原「調整池」(HB1589-2002.12.28),「溜池3」(HB1590-2002.12.28),川西西「溜池16」(HB1605-2002.12.30),中福家南「溜池24」(HB1626-2003.1.11),お前泉「楠井上池」(HB1627-2003.1.11);綾南町小野内間東「溜池7」(KHB933-1998.3.28),滝宮横山西「安田池」(HB938-1998.3.28),陶日原「溜池21」(HB1576-2002.12.23);飯山町東坂元割古「足利池」(HB399-1994.2.13);高瀬町上高瀬東原「溜池9」(HB1095-1999.9.18),下麻西大原「吉池」(HB1278-2000.12.2),五反地「寒池」(KHB1239-2000.10.21);三野町吉津汐木原「瀬入池」(HB1348-2001.1.13);豊中町比地大小山東「蓮池」(HB685-1997.1.15)

・ゴミマルカイミジンコ属一種 *Cypridopsis* sp.

幼生標本のため種を同定出来なかった。

<標本産地>綾南町陶日原「溜池15」(HB1552-2002.10.24)

・キブリス科Cyprididae不明種

カイミジンコ類の産地を記録しておくため、種を同定出来なかったものと共に、幼生標本や殻が破損して所属が不明なもの等を一括してここにまとめた。大多数の標本は溜め池から採集されたものであるが、公園の池1

箇所とダム湖2箇所から採集されたものも含まれている。

<標本産地>大内町三殿三殿「飯山池」(HB804-1998.1.3);大川町田面大東「溜池25」(HB1567-2002.12.3);志度町鴨部白川原「大池」(KHB628-1996.2.12),小田浦小田「合蔵池」(HB1479-2001.12.27);寒川町石田西山田「溜池3」(KHB983-1998.11.22),「中池」(HB996-1998.11.28);長尾町前山中津「前山ダム」(KHB623-1996.1.28),造田是弘北山「寺池」(HB921-1998.3.7);三木町氷上長楽寺「藤池」(HB339-1994.1.21),池戸鍋淵「菖蒲池」(KHB888-1998.2.22),朝倉本村上「溜池11」(KHB1241-2000.10.24);高松市檀紙町「道池」(KHB219-1993.2.20),寺井町「行寺池」(HB223-1993.2.24),高松町「新池」(KHB480-1994.3.20),川島東町「新池」(KHB487-1994.4.13),栗林町栗林公園「西湖」(HB784-1997.9.3),東植田町「溜池18」(KHB1107-1999.11.3),西植田町葛谷「溜池26」(KHB1242-2000.10.29),菅沢町「溜池31」(HB1407-2001.4.1);国分寺町福家本村北「東大谷池」(KHB1612-2002.12.31);坂出市川津町峠「川池」(KHB404-1994.2.13);綾南町滝宮中原「溜池8」(HB937-1998.3.28),

畑田茶円原「鶉生池」(HB963-1998.10.17),羽床下奥谷下「下池」(KHB1285-2000.12.14),陶北内「僧池」(HB1582-2002.12.23);綾歌町岡田西畑田下「成願寺池」(KHB437-1994.2.20);丸亀市川西町南剣木「八丈池」(HB357-1994.1.23);仲南町十郷新目「立石ダム」(KHB1550-2002.10.12),買田「奥谷下池」(KHA379-2002.11.24);高瀬町下麻河中「九頭神池」(HB639-1996.3.4),比地中宮ノ谷「宮池」(HB880-1998.2.21),上麻岩瀬「岩瀬池」(KHB953-1998.10.3),胡麻谷「溜池4」(KHB971-1998.10.31),上高瀬平見「刈ヶ谷池」(HB1097-1999.9.18),羽方宮奥「溜池10」(KHB1102-1999.10.11),上勝間五歩田「溜池22」(KHB1234-2000.10.21);豊中町岡本帰来「二ノ池」(KHB631-1996.2.24);仁尾町仁尾詫間越「原池」(HB1341-2001.1.13);山本町辻池の向「国吉池」(HB798-1997.12.27);観音寺市池之尻町大長「守屋池」(KHB708-1997.2.9)

文 献

大久保一郎. 2004. 日本淡水産カイミジンコ類について. 岡山, 71pp.